

Exercices de Géométrie Différentielle 1

Séance 4 - 19/10/2021

1. On considère une fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que $(\nabla f)(x) \neq 0$ pour tout $x \in M := f^{-1}(\{0\})$.

(i) Montrer que M admet un atlas $\mathcal{A} = \{(U_{ij}, \varphi_{ij}) \mid 1 \leq i \leq n, j \in J_i\}$, où φ_{ij} est la restriction à U_{ij} de la projection

$$\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-1} : (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

(ii) Montrer que l'espace tangent à M en un point $p \in M$ s'identifie au supplémentaire orthogonal de $(\nabla f)(p)$ dans \mathbb{R}^n , c'est-à-dire

$$T_p M \cong \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle (\nabla f)(p), v \rangle = 0\}.$$

(iii) Pour tout $p \in U_{ij}$, calculer le vecteur de \mathbb{R}^n correspondant au vecteur tangent $\frac{\partial}{\partial u_k} \Big|_p$ de $T_p M$ si (u_1, \dots, u_{n-1}) sont les coordonnées locales associées à la carte (U_{ij}, φ_{ij}) définie ci-dessus.

Indication. On rappelle que les vecteurs tangents peuvent être exprimés comme des dérivations le long de courbes sur la variété.

2. Soient M et N deux variétés lisses. On considère le graphe d'une fonction lisse $f : M \rightarrow N$:

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) \mid x \in M\},$$

qui, pour rappel, possède une structure naturelle de variété lisse. Montrer que l'espace tangent au point $(x, f(x)) \in \Gamma_f$ fixé s'identifie au graphe de la différentielle de f en x , c'est-à-dire :

$$T_{(x, f(x))} \Gamma_f \cong \{(v, f_{*x}(v)) \mid v \in T_x M\}.$$

Indication. On rappelle que l'espace tangent à un produit direct de variétés lisses est canoniquement isomorphe à la somme directe des espaces tangents.

A. On considère la nappe d'hyperboloïde

$$H := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_n^2 = 1, \quad x_1 > 0\}$$

munie de la topologie induite de \mathbb{R}^n et de la structure de variété lisse définie dans l'exercice 1, pour les ensembles de niveau. Calculer la différentielle de l'application suivante, supposée lisse :

$$s_0 : \begin{cases} H & \rightarrow H \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto (x_1, -x_2, \dots, -x_n) \end{cases}$$

appelée la symétrie centrée en $p_0 = (1, 0, \dots, 0)$.

B. Soient $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{P}^n$ la projection naturelle et $p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Pour tout $D \in \text{Der}_p \mathbb{R}^n$ et $f \in C^\infty(\mathbb{R}\mathbb{P}^n)$, on définit

$$\partial f = D(f \circ \pi). \tag{1}$$

1. Montrer que ∂ est une dérivation en $\pi(p)$.
2. En utilisant (1) construire une base de $\text{Der}_{[p]} \mathbb{R}\mathbb{P}^n$.